



ТАБАК И НИКОТИН ВРЕДЯТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ

... ЭТО ТОЛЬКО 6 ИЗ 100 ПРИЧИН, ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ


УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА САЙТЕ [HTTP://МОСГЕОЗ.BY](http://мосгеоз.by)




Употребление табака и воздействие табачного дыма во время беременности повышают риск внутриутробной гибели плода.



Женщины, которые курят или подвергаются воздействию вторичного табачного дыма во время беременности, подвергаются повышенному риску выкидыша.



Мертворождение (роды плода, умершего в утробе матери) наиболее распространено из-за кислородного голодания плода и плацентарных аномалий, вызванных угарным газом и никотином табачного дыма и бездымного табака.



Курильщицы подвержены более высокому риску внематочной беременности (потенциально смертельного осложнения для матери, при котором оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется вне матки).



Прекращение курения и защита от воздействия вторичного табачного дыма особенно важны для женщин репродуктивного возраста, планирующих беременность, и во время беременности.



Младенцы, рожденные женщинами, которые курят, употребляют бездымный табак или подвергаются воздействию вторичного табачного дыма во время беременности, имеют более высокий риск преждевременных родов и низкой массы тела при рождении.